


بسمه تعالی



NIME SHABAN HOSPITAL

کد سند: QI/EP/۰۰۲۴/۰۱-۰۴

بیمارستان نیمه شعبان ساری




عنوان			آنژیوپلاستی	
تهیه کننده سمت			سحر رضی پرستار	
منابع			برونروسودارث	
سال تهیه			۱۴۰۵	بازنگری ۱۴۰۷
تایید			رئیس بخش: آقای دکتر باقری	
کمیته آموزش				

- با هماهنگی پرستار بخش، برای دفع سریع داروها و پاکسازی خون از ماده حاجب مایعات فراوان بنوشید.
- درد خفیف تورم کم و قرمزی یا کبودی مختصر در محل ورود کاتتر آنژیوپلاستی طبیعی است.



قلب سالم، با سبک زندگی سالم



آدرس بیمارستان: ساری

بلوار پاسداران. بیمارستان نیمه شعبان

شماره تماس: ۳۳۳۴۰۱۱۱


داخلی بخش پست کت: ۲۲۰

- در زمان باز کردن تنگی رگ ممکن است به صورت گذرا دچار درد قفسه سینه شوید که طبیعی است و زود برطرف می شود.
- هر حال هرگونه احساس ناخوشایند را به پرستار یا پزشک اطلاع دهید.
- پس از انجام آنژیوپلاستی شما مجدداً به بخش آمادگی (پست کت) برگردانده می شوید و تحت مراقبت ویژه قرار می گیرید.

خود مراقبتی بعد از آنژیوپلاستی

- پس از آنژیوپلاستی تا چند ساعت باید استراحت مطلق نموده، وضعیت خوابیده به پشت با زاویه ۳۰ درجه یا کمتر را رعایت کنید.
- کاتتر کشاله ران معمولاً چند ساعت بعد از آنژیوپلاستی خارج می شود.
- اگر احساس کردید محل ورود کاتتر خونریزی دارد یا متورم و سفتی زیاد در کشاله ران شدید، به پرستار اطلاع دهید.
- در صورت داشتن هرگونه علائم غیر طبیعی از جمله درد قفسه سینه، تپش قلب، درد شکم یا کشاله ران، احساس سردی، گزگز پاها یا عدم توانایی در حرکت دادن انگشتان پا، سریعاً به پرستار اطلاع دهید

آنژیوپلاستی



هدف از انجام آنژیوپلاستی، گشاد کردن عروق تنگ شده در اثر پلاک های چربی، بهبود خونرسانی به قلب و کاهش خطر بروز حمله قلبی است. در این روش همانند آنژیوگرافی یک کاتتر از سرخرگ کشاله ران به سمت قلب هدایت می شود تا زمانی که به محل گرفتگی برسد، سپس پزشک با باد کردن انتهای کاتتر، مجرای تنگ شده را باز می کند و یک وسیله فنری شکل (استنت) را داخل مجرای رگ قرار می دهد.


آمادگی های قبل از آنژیوپلاستی

- به هنگام بستری تمامی مدارک پزشکی (نوار قلب، اکو، آزمایش، تست ورزش، سی تی اسکن) را به همراه داشته باشید.
- در صورت سابقه بیماری کلیوی، تنفسی و بیماری خونی و یا حساسیت به دارو یا مواد غذایی

بخصوص مواد یددار مانند ماهی به پزشک معالج اطلاع دهید.

- تا قبل از شروع عمل بالون گذاری باید ۸ عدد قرص پلاویکس مصرف کرده باشید.
- در بخش از شما آزمایشهای خونی، نوار قلب گرفته خواهد شد.
- هر دو طرف کشاله ران و مچ دست ها باید تمیز و شیو گردد.
- در صورت استفاده از قرص قند یا انسولین، مصرف آنها صبح آنژیوپلاستی قطع گردد.
- قبل از آنژیوپلاستی باید حدود ۶ ساعت ناشتا باشید.

آنژیوپلاستی



داخل کت لب

- پس از ورود به اتاق کت لب شما روی تخت مخصوص دراز می کشید، پرستار آمادگی های مقدماتی را برای شما انجام می دهد و سپس پزشک آنژیوپلاستی را آغاز می کند.
- حین انجام آنژیوپلاستی شما بیدار هستید، مضطرب نشوید و نکاتی را که تیم پزشکی به شما توصیه می کنند انجام دهید به عنوان مثال ممکن است از شما بخواهند که نفس عمیق بکشید یا سرفه کنید.
- هنگام عبور کاتتر از رگ ها به سمت قلب ممکن است تپش قلب پیدا کنید.
- هنگام تزریق ماده حاجب احساس گر گرفتگی و یا دفع ادرار داشته باشید.

